Erstbeobachtungs- und Sangesbeginnsdaten im Kreis Parchim 2006

zusammengestellt von Dr. Klaus-Dieter Feige (Matzlow)

Wie in jedem Jahr wurden auch 2006 wieder Erstbeobachtungen notiert und Sangesbeginnsdaten gesammelt. 12 Beobachter stellten ihre Daten zur Verfügung:

H. Bornhöft, Broock, Gallin – **L. Daubner,** Sternberg, Dabel - **K.-D. Feige**, Matzlow – **K. Goeritz**, Plate, Goldenstädt – **M. Hippke**, Parchim – **S. Horn**, Lübz - **W. Kintzel**, Slate - **M. Lüpke**, Plau – **W. Mewes** Plau - **E. Schmidt**, Wendorf – **P. Steinbach**, Karow - **H. Zimmermann,** Lewitz, Schwerin.

Methodik:
Die Beobachter haben sich in der Regel an die vorgegebene Erfassungsliste gehalten. Einige Beobachter übermittelten bei wenigen Arten auch zwei Beobachtungen aus verschiedenen Kontrollgebieten. Insgesamt konnten 478 Daten ausgewertet werden. Da nicht alle Beobachter alle Arten notieren konnten, kam ein Datenquote von 54,6 % zustande, diese liegt etwas über dem Normalen.
Die Daten von 10 Arten konnten wegen zu geringer Datenumfänge (n<4) nicht ausgewertet werden. Insgesamt war die Datenkomprimierung problemlos zu vollziehen.
Die Verteilung der Beobachtungen auf die Wochentage war wenig ausgeglichen. Überraschend dabei der überproportionierte Montag (evtl. durch die Montage am 1. Mai, Pfingsten, Ostern hervorgerufen).

Abb. 1:



Tabelle der zusammengefassten Beobachtungsdaten 2007

Arten	n	Mittelwert	früheste Beob.	s
Amsel	9	13.03.2006	01.03.2006	10,52
Baumpieper	8	15.04.2006	03.04.2006	5,24
Blaumeise	8	28.01.2006	13.01.2006	12,40
Bluthänfling	6	10.04.2006	30.03.2006	13,92
Braunkehlchen (SB)EB	6	25.04.2006	18.04.2006	6,09
Braunkehlchen SB	4	25.04.2006	21.04.2006	4,32
Buchfink	8	18.03.2006	04.03.2006	8,50
Dorngrasmücke	9	02.05.2006	25.04.2006	4,68
Feldlerche EB	6	04.03.2006	31.01.2006	23,86
Feldlerche SB	5	12.03.2006	18.02.2006	20,19
Feldschwirl	6	03.05.2006	25.04.2006	5,71
Fischadler	6	04.04.2006	29.03.2006	9,44
Fitislaubsänger	10	11.04.2006	04.04.2006	4,67
Gartengrasmücke	9	03.05.2006	25.04.2006	3,57
Gartenrotschwanz SB(EB)	9	18.04.2006	02.04.2006	9,51
Gebirgsstelze	4	03.04.2006	01.04.2006	4,19
Gelbspötter	5	17.05.2006	06.05.2006	10,69
Girlitz	6	20.04.2006	06.04.2006	8,04
Goldammer	10	10.03.2006	19.02.2006	9,43
Gr. Rohrdommel EB/SB	6	10.03.2006	28.01.2006	36,19
Graugans	8	08.02.2006	25.01.2006	8,70
Hausrotschwanz SB(EB)	11	01.04.2006	26.03.2006	4,93
Heckenbraunelle	8	22.03.2006	27.01.2006	22,16
Heidelerche SB(EB)	8	31.03.2006	23.03.2006	13,02
Kiebitz	6	24.02.2006	09.02.2006	16,34
Kleiber	6	03.02.2006	02.01.2006	25,08
Kohlmeise	7	26.01.2006	13.01.2006	15,43
Kranich	9	20.02.2006	17.02.2006	5,07
Kuckuck	12	30.04.2006	17.04.2006	4,90
Mauersegler	7	05.05.2006	01.05.2006	5,55
Mehlschwalbe	7	01.05.2006	27.04.2006	3,37
Misteldrossel	4	16.03.2006	09.03.2006	6,13
Mönchsgrasmücke	9	17.04.2006	09.04.2006	4,81

Arten	n	Mittelwert	früheste Beob.	s
Nachtigall	10	20.04.2006	09.04.2006	5,72
Neuntöter	7	15.05.2006	02.05.2006	8,83
Ortolan	7	05.05.2006	25.04.2006	7,81
Pirol SB	7	07.05.2006	03.05.2006	1,91
Rauchschwalbe	12	07.04.2006	25.03.2006	8,21
Ringeltaube	5	10.02.2006	21.01.2006	12,70
Rohrammer EB	4	13.03.2006	28.01.2006	29,74
Rohrschwirl	7	27.04.2006	18.04.2006	5,76
Rohrweihe	10	06.04.2006	25.03.2006	15,05
Roter Milan	8	07.03.2006	24.02.2006	11,06
Rotkehlchen	6	14.03.2006	20.01.2006	27,15
Schafstelze EB	7	17.04.2006	03.04.2006	8,97
Singdrossel EB	6	21.03.2006	24.02.2006	13,05
Singdrossel SB	6	26.03.2006	22.03.2006	4,00
Star EB	6	12.02.2006	02.01.2006	22,20
Star SB	5	15.02.2006	08.02.2006	7,44
Sumpfrohrsänger	5	17.05.2006	09.05.2006	7,46
Teichrohrsänger	7	01.05.2006	20.04.2006	7,63
Trauerschnäpper EB/SB	5	29.04.2006	21.04.2006	7,16
Wachtel	5	19.05.2006	24.04.2006	28,91
Waldlaubsänger	9	26.04.2006	21.04.2006	5,43
Weidenlaubsänger	11	31.03.2006	27.03.2006	2,49
Weiße Bachstelze	10	20.03.2006	03.03.2006	7,24
Weißstorch	4	07.04.2006	03.04.2006	4,12
Wendehals	7	01.05.2006	23.04.2006	7,61
Zaungrasmücke	9	23.04.2006	19.04.2006	3,37

Die gemittelte Verteilung der verfügbaren Daten weicht trotz der langen kühlen Witterungsperiode im März 2006 kaum von der in den Vorjahren ab. Auffällig sind jedoch die Details. Deutlich sichtbar ist die Häufung von phänologischen Daten Ende März/Anfang April 2006 unmittelbar nach Ende der „Eiszeit“ (Abb. 3).

Abb. 2:



Abb. 3:

